

ALGORITMO LÍPIDOS ESC:

Novos *targets* em Doentes de Elevado Risco^{2,3}


Doente com níveis de TG elevados (≥ 175 mg/dL sem jejum ou ≥ 150 mg/dL em jejum)

- Definir e atingir objetivo terapêutico de c-LDL.
- Definir objetivo terapêutico de colesterol não-HDL.
- Excluir/tratar causas secundárias de hipertrigliceridemia.
- Implementar mudanças no estilo de vida.

Objetivo terapêutico do colesterol não-HDL
NÃO atingido
TG elevados

Os níveis de TG são
iguais ou superiores a
885 mg/dL?

NÃO



Objetivo primário: redução do risco CV

Dependendo do risco CV do doente,
avaliar a necessidade de uma maior
redução no colesterol não-HDL:

- Considerar a adição de fibratos e/ou ácidos gordos ómega 3 à terapêutica.
- Considerar uma maior redução no c-LDL.

TG, triglicédeos; c-LDL, colesterol associado a lipoproteínas de baixa densidade; HDL, lipoproteínas de elevada densidade; CV, cardiovascular.

2. Luscher TF. 'The lower the better' revisited: the new lipid targets in high risk patients. Eur Heart J. 2020;41:1-3.

3. Laufs U, Parhofer KG, Hegele RA, Ginsberg HN, Hegele RA. Clinical review on triglycerides. Eur Heart J. 2019;41(1):99-109c.