

ALGORITMO LÍPIDOS ESC:

Novos targets em Doentes de Elevado Risco^{2,3}

Doente com níveis de TG elevados (≥ 175 mg/dL sem jejum ou ≥ 150 mg/dL em jejum)

- Definir e atingir objetivo terapêutico de c-LDL.
- Definir objetivo terapêutico de colesterol não-HDL.
- Excluir/tratar causas secundárias de hipertrigliceridemia.
- Implementar mudanças no estilo de vida.

Objetivo terapêutico do colesterol não-HDL
NÃO atingido
TG elevados

Os níveis de TG são
iguais ou superiores a
885 mg/dL?

SIM



Objetivo primário: prevenção da pancreatite
É necessária uma maior redução dos níveis de TG

- Intensificar as mudanças no estilo de vida.
- Considerar a adição de fibratos e/ou ácidos gordos ómega 3 à terapêutica.
- Considerar a utilização de gorduras com ácidos gordos de cadeia média.
- Consultar um especialista.

**Objetivo primário:
prevenção da pancreatite**



Considerar a utilização de terapêuticas experimentais.

SIM

Os níveis de TG são
iguais ou superiores a
885 mg/dL?

TG, triglicédeos; c-LDL, colesterol associado a lipoproteínas de baixa densidade; HDL, lipoproteínas de elevada densidade; CV, cardiovascular.

2. Luscher TF. 'The lower the better' revisited: the new lipid targets in high risk patients. Eur Heart J. 2020;41:1-3.

3. Laufs U, Parhofer KG, Hegele RA, Ginsberg HN, Hegele RA. Clinical review on triglycerides. Eur Heart J. 2019;41(1):99-109c.